



SaniBarrier-Ozo

Soluzione a base di Neozone 4000 (olio di girasole iperozonizzato) ad azione igienizzante da applicare sulle mucose della bocca dell'animale.

PROTOCOLLI D'UTILIZZO

- ✓ Coadiuvante nel trattamento delle **forme diarroiche e infezioni gastroenteriche**
- ✓ **Vitelli**
- ✓ **Animali adulti** (bovini, suini, ovi-caprini)
- ✓ **Animali da compagnia** (cani, gatti)
- ✓ Adatto per ripristino dei tessuti orali dopo lacerazioni, abrasioni, irritazioni

MODALITÀ D'USO

Applicare SaniBarrier-Ozo sulle mucose della bocca. Per una effettiva azione igienizzante è bene spruzzare il prodotto ai lati della lingua, sulla mucosa della guancia.

POSOLOGIA

Peso dell'animale	Quantità di prodotto da applicare al giorno
3 - 6 kg	1,0 ml
6 - 10 kg	2,0 ml
10 - 30 kg	4,0 ml
30 - 50 kg	7,5 ml
50 kg - 100 kg	<ul style="list-style-type: none">▪ 1° giorno: 5 ml per ciascun lato della bocca (totale 10 ml)▪ i giorni successivi: 10 ml in totale
> 100 kg	<ul style="list-style-type: none">▪ 1° giorno: 10 ml ogni 100-150 kg di peso, per ciascun lato della bocca▪ i giorni successivi: 20 ml in totale ogni 100-150 kg di peso

- ✓ Dopo il trattamento l'animale può essere normalmente alimentato e/o abbeverato.
- ✓ Prodotto cosmetico per uso veterinario. Non richiede ricetta veterinaria. Non lascia residui.
- ✓ Contenuto della confezione: 3 flaconi da 100 ml e 1 erogatore.

PROTOCOLLI D'USO PER VITELLI

Alla nascita il vitello è palesemente esposto all'inquinamento boccale. A seconda della pulizia della zona parto, cambiano moltissimo i rischi di colonizzazione anomala dell'intestino.

I protocolli suggeriti per i vitelli sono diversi a seconda dell'abituale gestione della vitellaia e dei vitelli a partire dal parto.

L'uso di SaniBarrier-Ozo è fortemente **consigliato a titolo preventivo**, per evitare il più possibile infezioni batteriche che pregiudicano il regolare sviluppo dell'animale. È infatti noto che il mancato accrescimento ottimale di una vitella nelle prime settimane di vita riduce in modo irrimediabile le potenzialità genetiche e fenotipiche in età adulta.

1. IN PREVENZIONE

Avvenuta la fondamentale scostratura, somministrare al vitello in un'unica soluzione:
5 ml (2,5 ml per ciascun lato della bocca)

2. PRIME FORME DIARROICHE LEGGERE

5 ml il primo giorno in un'unica soluzione (2,5 ml per ciascun lato della bocca)
2,5 ml (una somministrazione) il giorno dopo

3. DIARREA BATTERICA EVIDENTE

5 ml il primo giorno in un'unica soluzione (2,5 ml per ciascun lato della bocca)
5 ml il giorno dopo (2,5 ml per ciascun lato della bocca)

Non tutti i vitelli rispondono al trattamento nella stessa maniera. Se necessario ripetere il trattamento il terzo giorno (casi raramente riscontrati).

4. NEL CASO DI ASSENZA DI VACCINAZIONI o per una PREVENZIONE D'IMPATTO

5 ml PRIMA di ogni somministrazione del colostro per almeno i primi quattro pasti (i più importanti).

Ricordare che il colostro delle primipare è meno ricco di immunoglobuline rispetto alle pluripare

Nel caso di diarree e bene sostituire, in modo parziale o totale, la somministrazione del latte ai vitelli, fino al ritorno alla normalità.

NOVAGEN consiglia l'uso del noto e ottimo prodotto tedesco **RESOLVER**, reidratante, antidiarroico ed energetico. **RESOLVER** è una polvere facilmente solubile usata da più di dieci anni in Europa.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'USO DI SANIBARRIER-OZO

Cell. 335.6938637

e-mail: ozone@novagen.info